

Granulat na Ślimaki Vitrol GB 5 kg



Cena: 124,78 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 2 sztuki

Producent Bros

Opis produktu

Granulat na ?limaki Vitrol GB 5 kg



Vitrol w formie granulatu - przyn?ty gotowej do u?ycia (RB), przeznaczony do **zwalczania ?limaków nagich i oskorupionych**. Dzi?ki specjalnie dobranej przyn?cie skutecznie wabi ?limaki i jest przez nie ch?tnie zjadany.

Mechanizm dzia?ania substancji czynnej ?rodka - pirofosforanu ?elaza, polega na redukcji wydzielania ?luzu przez ?limaki. ?rodek powoduje natychmiastowe zahamowanie ?erowania ?limaków na uprawach - ju? po

jednokrotnym spożyciu?rodka szkodniki trac? apetyt i zaprzestaj? uszkodzania ro?lin. **Po spożyciu granul ?limaki zazwyczaj chowaj? si? w glebie / pod?o?u, gdzie gin?, dzi?ki czemu na chronionym obszarze nie wida? ?luzu i martwych ?limaków.** Z tego wzgl?du efekty stosowania ?rodka mog? nie by? widoczne od razu i skuteczno?? ?rodka nale?y mierzy? po?rednio - mniejszym rozmiarem szk?d wyrz?dzonych przez szkodniki. ?rodek zawiera substancj? czynn? ulegaj?c? rozk?adowi na jony fosforanowe i jony ?elaza, które naturalnie wyst?puj? w glebie.

Preparat mo?e by? stosowany w obecno?ci zwierz?t domowych, ptaków i je?y.

G?ówne cechy:

- skutecznie zwalcza ?limaki nagie i oskorupione
- odporny na deszcz, nie dzia?a szkodliwie na ptaki, psy i inne zwierz?ta domowe
- do stosowania w rolnictwie ekologicznym



Sposób użycia:

UWAGA: Pełna informacja o sposobie użycia znajduje się na opakowaniu. Należy zapoznać się z informacjami z etykiety przed zastosowaniem produktu.

Środek rozsypuje się równomiernie za pomocą aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin.

Truskawka i inne rośliny sadownicze (w uprawie polowej, szklarniowej i pod osłonami)

- Ślimaki nagie, ślimaki oskorupione.
- Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 g/10 m²
- Termin stosowania: środek stosować po rozpoczęciu wegetacji lub po posadzeniu roślin i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez szkodniki.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cykl uprawy): 6
- Odstępy między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Aksamitka, funkia i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)

- Ślimaki nagie
- Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25

g/10 m²

- Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12-25 g/10 m²
- Termin stosowania: ?rodek stosowa? przed wschodami (BBCH 00) lub po wschodach lub po posadzeniu ro?lin i w pó?niejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu si? szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrz?dzonych przez szkodniki.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy):
6
- Odst?py mi?dzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

UWAGA! Ze ?rodków ochrony ro?lin nale?y korzysta? z zachowaniem bezpiecze?stwa. Przed ka?dym u?yciem przeczytaj informacj? zamieszczone w etykiecie i informacje dotycz?ce produktu. Zwró? uwag? na zwroty wskazuj?ce rodzaj zagro?enia oraz przestrzegaj ?rodków ostro?no?ci zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów b?d?cych ?rodkami ochrony ro?lin w rozumieniu ustawy o ?rodkach ochrony ro?lin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporz?dzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), z?o?y? zamówienie oraz by? umow? sprzeda?y mog? jedynie

Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).



