

Granulat na Ślimaki Snacol 3GB 200g + 50g



Opis produktu

Cena: 11,84 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk

Producent Bros

Granulat na ?limaki Snacol 3GB 200g + 50g



Granulat na ?limaki Snacol 3GB 200g + 50g

Moluskocyd w formie granulowanej przyn?ty gotowej do stosowania (RB), przeznaczony g?ównie do zwalczania ?limaków nagich (w

przypadku roślin ozdobnych również ślimaków oskorupionych).

Środki działające w sposób skuteczny wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany. W wyniku spożycia środka przez ślimaki następuje ich odwodnienie, a następnie śmierć na skutek odwodnienia organizmu. Środek zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu.





UWAGA: Pełna treść instrukcji użycia produktu znajduje się na opakowaniu. Należy zapoznać się ze sposobem użycia produktu opisanym na opakowaniu przed jego użyciem.

Środek przeznaczony do stosowania ręcznie, poprzez aplikację bezpośrednio z opakowania lub za pomocą aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin. Należy go aplikować równomiernie na całej powierzchni gleby między roślinami i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać roślin uprawnych.

Stosowanie środka:

Truskawka (w uprawie polowej) - ślimaki nagie

- Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².
- Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, w okresie rozwoju i dojrzewania owoców truskawki.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
- Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Kapusta głowiasta (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami) - ślimaki nagie

- Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².
- Termin stosowania: ?rodek stosowa? po zaobserwowaniu ?limaków lub pierwszych szkód wyrz?dzonych przez te szkodniki, od 7 dni przed siewem lub sadzeniem ro?lin do fazy pocz?tku rozwoju cz??ci ro?lin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41).
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
- Odst?py pomi?dzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Sa?ata, szpinak, seler li?ciowy i inne warzywa li?ciowe (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod os?onami) - ?limaki nagie

- Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².
- Termin stosowania: ?rodek stosowa? po zaobserwowaniu ?limaków lub pierwszych szkód wyrz?dzonych przez te szkodniki, od 7 dni przed siewem lub sadzeniem ro?lin do fazy, gdy zostanie osi?gni?te 10% masy li?ciowej charakterystycznej dla danej odmiany.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
- Odst?p mi?dzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Funkia, aksamitka i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami) - ślimaki nagie i wstężyk ogrodowy (ślimak oskorupiony)

- Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².
- Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni





UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Opakowanie zawiera środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Nabywanie środków ochrony roślin poprzez zawarcie umowy na odległość

mog? dokonywa? jedynie osoby pe?noletnie oraz posiadaj?ce kwalifikacje wymagane od os?b nabywaj?cych ?rodki ochrony ro?lin okre?lone w art. 28. Ustawy o ?rodkach ochrony ro?lin z dnia 8 marca 2013 r.



Galeria

