

Granulat na Ślimaki Vitrol GB 1 kg



Cena: 30,23 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk

Producent Bros

Opis produktu

Granulat na ?limaki Vitrol GB 1 kg

BROS



Granulat na ślimaki Vitrol GB 1 kg

Vitrol w formie granulatu - przynajmniej gotowej do użycia (RB), przeznaczony do **zwalczania ślimaków nagich i oskorupionych**. Dzięki specjalnie dobranej przynajmniej skutecznie wabi ślimaki i jest przez nich chętnie zjadany.

Mechanizm działania substancji czynnej **rodka** - pirofosforanu **elaza**, polega na redukcji wydzielania **luzu** przez ślimaki. **rodek** powoduje natychmiastowe zahamowanie **erowania** ślimaków na uprawach - już po jednokrotnym spożyciu **rodka** szkodniki tracą apetyt i zaprzestają uszkodzania roślin. **Po spożyciu granul ślimaki zazwyczaj chowają się w glebie / podłożu, gdzie giną, dzięki czemu na chronionym obszarze nie widać luzu i martwych ślimaków**. Z tego względu efekty stosowania **rodka** mogą nie być widoczne od razu i skuteczność **rodka** należy

mierzy? po?rednio - mniejszym rozmiarem szkód wyrz?dzonych przez szkodniki. ?rodek zawiera substancj? czynn? ulegaj?c? rozk?adowi na jony fosforanowe i jony ?elaza, które naturalnie wyst?puj? w glebie.

Preparat mo?e by? stosowany w obecno?ci zwierz?t domowych, ptaków i je?y.

G?ówne cechy:

- skutecznie zwalcza ?limaki nagie i oskorupione
- odporny na deszcz, nie dzia?a szkodliwie na ptaki, psy i inne zwierz?ta domowe
- do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Sposób u?ycia:

UWAGA: Pe?na informacja o sposobie u?ycia znajduje si? na opakowaniu. Nale?y zapozna? si? z informacjami z etykiety przed zastosowaniem produktu.

¿rodek rozsypywa? równomiernie za pomoc? aplikatora do granulowanych ¿rodków ochrony ro?lin.

Truskawka i inne ro?liny sadownicze (w uprawie polowej, szklarniowej i pod os?onami)

- ¿limaki nagie, ¿limaki oskorupione.
- Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 g/10 m²
- Termin stosowania: ¿rodek stosowa? po rozpocz?ciu wegetacji lub po posadzeniu ro?lin i w pó?niejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu si? szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrz?dzonych przez szkodniki.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cykl uprawy): 6
- Odst?py mi?dzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Aksamitka, funkia i inne ro?liny ozdobne (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod os?onami)

- ¿limaki nagie
- Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/10 m²
- Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12-25 g/10 m²
- Termin stosowania: ¿rodek stosowa? przed wschodami (BBCH 00) lub po wschodach lub po posadzeniu ro?lin i w pó?niejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu si? szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrz?dzonych przez szkodniki.

- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy):
6
- Odstępy między zabiegami: co najmniej 14 dni.



UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), z którymi zamówienie oraz były objętym umową sprzedaży mogą być jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

