

Granulat na Ślimaki Vitrol GB 200g + 50g x 4 sztuki



Cena: 52,34 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk

Producent Bros

Opis produktu

Granulat na ?limaki Vitrol GB 200g + 50g x 4 sztuki

BROS



Vitrol w formie granulatu - przynajmniej gotowej do użycia (RB), przeznaczony do **zwalczania ślimaków nagich i oskorupionych**. Dzięki specjalnie dobranej przynajmniej skutecznie wabi ślimaki i jest przez nich chętnie zjadany.

Mechanizm działania substancji czynnej rodka - pirofosforanu selaza, polega na redukcji wydzielania śluzu przez ślimaki. Rodek powoduje natychmiastowe zahamowanie poruszania ślimaków na uprawach - już po jednokrotnym spożyciu rodka szkodniki tracą apetyt i zaprzestają uszkodzania roślin. **Po spożyciu granul ślimaki zazwyczaj chowają się w glebie / podłożu, gdzie giną, dzięki czemu na chronionym obszarze nie widać śluzu i martwych ślimaków.** Z tego względu efekty stosowania rodka mogą nie być widoczne od razu i skuteczność rodka należy mierzyć pośrednio - mniejszym rozmiarem szkód wyrządzonych przez szkodniki. Rodek zawiera substancję czynną ulegającą rozkładowi na jony

fosforanowe i jony żelaza, które naturalnie występują w glebie.

Preparat może być stosowany w obecności zwierząt domowych, ptaków i jeży.

Główne cechy:

- skutecznie zwalcza ślimaki nagie i oskorupione
- odporny na deszcz, nie działa szkodliwie na ptaki, psy i inne zwierzęta domowe
- do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Sposób użycia:

UWAGA: Pełna informacja o sposobie użycia znajduje się na opakowaniu. Należy zapoznać się z informacjami z etykiety przed zastosowaniem produktu.

Prodek rozsypuje równomiernie za pomocą aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin.

Truskawka i inne rośliny sadownicze (w uprawie polowej, szklarniowej i pod osłonami)

- Ślimaki nagie, ślimaki oskorupione.
- Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 g/10 m²
- Termin stosowania: środek stosować po rozpoczęciu wegetacji lub po posadzeniu roślin i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez szkodniki.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cykl uprawy): 6
- Odstępy między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Aksamitka, funkia i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)

- Ślimaki nagie
- Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/10 m²
- Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12-25 g/10 m²
- Termin stosowania: środek stosować przed wschodami (BBCH 00) lub po wschodach lub po posadzeniu roślin i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez szkodniki.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 6
- Odstępy między zabiegami: co najmniej 14 dni.



Uwaga! Kupując na tej aukcji otrzymasz 4 opakowania produktu.



UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach

ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

