


Środek chwastobójczy Agrosar 360 sl Bros 100 ml



Cena: 16,52 zł

Opis słownikowy

Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	Bros

Opis produktu

OPIS DZIAŁANIA HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

DZIAŁANIE NA CHWASTY środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałe kore), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

STOSOWANIE ŚRODKA środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego). Uwaga: środek ochrony roślin nie stosować w parkach i

ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, boisków oraz placówek opieki zdrowotnej.



Uwaga!

Produktów należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykiety i informacji dotyczące produktu.

AGROSAR 360 SL

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) i okulary ochronne. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412 Działają szkodliwie na organizmy wodne; powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280 Stosować rękawice ochronne. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć duży ilości wody. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opieką lekarza. P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

UFI: 8HYS-TOC6-Q00X-3QYN

Producent: BROS sp. z o.o

Nazwy własne: Bros, Microbec, Bopon
Adres pocztowy: ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Polska
Adres e-mail: biuro@bros.pl

Galeria

AGROSAR 360 SL
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znośzenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) i okulary ochronne. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne; powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280 Stosować rękawice ochronne. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
UFI: BHYS-T0C6-Q00X-3QYN
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karpia 24 61-619 Poznań, tel. 61 8262 512 e-mail: biuro@bros.pl, www.bros.pl
Zawartość netto: **100 ml**



OPIS DZIAŁANIA HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowany natłynie, występujący w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Zgodnie z klasyfikacją H412, substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G. DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek pobierały jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą kory), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnienie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.	
Dawka środka	Chwasty wrażliwe
80,0 ml/ha m ² (maksymalna dawka środka przy jednokrotnym stosowaniu)	babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobnny, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednolistna, fiolek polny, gorczyca polna, gwałtownica pospolita, iglica pospolita, jęczmień purpurowy, kromka biała, koniczyzna biała, kukułka pospolita, mak polny, maturna bobowna, mlecze polny, mniszek lekarski, nawłoc kanadyjska, owies gluchy, paluszki pospolite, perz walcowy, papawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotnik kanadyjski, przytula ogólna, rdest plasty, rdestowka powojowata (syn. rdest powojowaty), rogownica pospolita, rumianek pospolity, szałwiczka zwyczajna, szalwisk lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw kępowy, szczaw zwyczajny, tatarak pospolity, tobołki polne, wiewiółka roczna, wiewiółka gruczkowata, wiewiółka dziana, wyka piasa, wyka wąskolistna.
Chwasty średniowrażliwe	
30,0 ml/ha m ²	bodziszek drobnny, jasnota purpurowa.
50,0 ml/ha m ²	mlecze polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik penski, rdest plasty, szczaw polny, wierzbowica gruczkowata.
75,0 ml/ha m ²	kwaśnik pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik penski.
Pełny tekst etykiety środka dołączony jest do opakowania. Przed użyciem przeczytać instrukcję podane w załączonej ulotce.	
STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego). Uwaga: Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, szpitali oraz placówek opieki zdrowotnej.	

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środowiska ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska. Środek stosować na obszarze do 500 m². Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł. Nie dopuścić do znośzenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka. Oprysk wykonywać wyłącznie przy pomocy rozpylaczy średnio- i grubokropłowych.
WARUNKI PRZECHEWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:
-w oryginalnych opakowaniach,
-w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, składowanie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
-w temperaturze 0°C - 30°C.
Chronić przed nasłonecznieniem i wilgocią. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu upoważnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub murować je podobnie jak odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami ponad się sprzedawcy środków ochrony roślin.
HERCZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej: glifosat (związek z grupy aminofosforanów) - 360 g/l (30,9 %).
Zezwolenie MRIRW nr R- 35/2014 z dnia 13.03.2014 r., ostatnio zmienione decyzją MRIRW nr R- 1549/2024d z dnia 06.12.2024 r.
Okres ważności - 2 lata.
Data produkcji i nr partii na opakowaniu.
Posiadacz zezwolenia: QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. ul. Chemików 1 37-310 Nowa Szczylna Tel.: +48 17 24 07 111 e-mail: agro.pl@qemetica.com www.qemetica-agro.pl

