

Środek grzybobójczy i owadobójczy Substral Kompleksowa Ochrona 2w1 800 ml



Cena: 22,56 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	EVERGREEN

Opis produktu

?rodek grzybobójczy i owadobójczy Substral Kompleksowa Ochrona 2w1 800 ml

SUBSTRAL[®]



Środek grzybobójczy i owadobójczy Substral Kompleksowa Ochrona 2w1
800 ml

Substral Kwiaty Kompleksowa Ochrona 2w1. Unikalny środek grzybobójczy i owadobójczy do róŹ, rododendronów, krzewów kwitnących. Działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie - jednocześnie zwalcza owady i chroni przed chorobami. Środek działa: grzybobójczo, zwalczając czarna plamistość, rdz i mączniaka prawdziwego. Owadobójczo, zwalczając mszyce (zielone i czarne) i inne owady ssące. Gotowy do uŹycia produkt.

Cechy produktu:

- gotowy do uŹycia
- 2w1: środek grzybobójczy i owadobójczy
- szybko widoczne efekty
- chroni przez okres 21 dni

Opis produktu

Substral Kwiaty Kompleksowa Ochrona 2w1 będący jednocześnie insektycydem i fungicydem preparat jest środkiem grzybobójczym i

owadobójczym w formie spray gotowego do użycia, o działaniu systemicznym stosowanym w zapobiegawczej i interwencyjnej walce z chorobami grzybowymi, mszycami i innymi owadami powszechnie atakującymi amatorskie uprawy roślin ozdobnych (m.in. róże, rośliny rabatowe, krzewy ozdobne). Kwiaty 2w1 Kompleksowa Ochrona umożliwia ogrodnikowi działania na wszystkich frontach walki - na roślinie działając powierzchniowo, węgłownie i systemicznie. Środek jest szybko pobierany przez zielone części roślin i jest przemieszczany wraz z sokami po całej roślinie. Owady żywiąc się sokami roślin giną, nawet jeśli nie zostały bezpośrednio opryskane. Opady deszczu, zmywanie środka z powierzchni roślin oraz wpływ promieniowania słonecznego nie mają istotnego znaczenia w przypadku środka charakteryzującego się działaniem systemicznym. Środek nie pozostawia brudzących osadów na liściach, a efekty jego zastosowania są zauważalne już po 24 godzinach. Preparat umożliwia zabezpieczenie całej rośliny przed wtórnymi infekcjami oraz nalotami mszyc. W przypadku róży długotrwała ochrona może trwać nieprzerwanie przez 21 dni. Preparat zapobiega zniekształceniom liści oraz korzystnie wpływa na wybarwienie i wzrost roślin.

Jak stosować?

Wstrząsnąć przed użyciem. Skierować dyszę spryskującą w stronę rośliny (należy zwrócić uwagę by dysza spryskująca nie była zwrócona w stronę użytkownika lub osób postronnych). Rośliny opryskiwać tak aby ciecz uytłokowała dokładnie pokryć górną i dolną część liści, unikając spływania kropel.

Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby lub oznak obecności szkodników. Jeśli to konieczne następnymi zabiegami wykonać regularnie co 3 - 4 tygodnie kiedy roślina jest porażona chorobą lub opanowana przez mszyce należy opryskiwać co 2 tygodnie. Środek stosować do końca września. W ochronie róży przed czarną plamistością środek można stosować już od kwietnia. W sytuacji,

gdy choroba mocno zainfekowała rośliny w roku poprzednim, zabiegi należy rozpocząć wcześniej, gdy tylko pojawią się zawiązki i liście. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 4. Odstęp między zabiegami - co najmniej 14 dni.

Uwagi:

Opryskiwać rośliny upewniamy się, że zarówno dolna jak górna część liści została zmoczona. Unikać bezpośredniego opryskiwania kwiatów.

Opryskiwać podczas dobrych warunków pogodowych, unikać ostrego wiatru i słońca, suszy i mrozu.

Przed zastosowaniem środka na wiązki lub szczególnie cenne kolekcje roślin ozdobnych wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia roślin.

Nie stosować środka przy dużym wietrze, w pełnym słońcu, w okresie suszy oraz po i w czasie przymrozków, a także przed spodziewanymi przymrozkami.

W przypadku wciornastków i przędziorków środek wykazuje średni poziom zwalczania lub ogranicza występowanie szkodników.

W przypadku występowania w populacji owadów (zwłaszcza mszyc) form odpornych środek może nie być w pełni skuteczny.

Środek niebezpieczny dla pszczoły. Aby chronić pszczoły i inne owady zapylające nie stosować środka w okresie lotu pszczoły na polach oraz kiedy obecne są kwitnące chwasty.

W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na pszczoły zaleca się stosowanie środka rano lub wieczorem. 9. Nie dopuścić do przedostania się

?rodka na inne ro?liny konsumpcyjne np. warzywa.

Okres od zastosowania ?rodka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano ?rodek mog? wej?? ludzie oraz zosta? wprowadzone zwierz?ta (okres prewencji): nie wchodzi? do czasu ca?kowitego wyschni?cia cieczy u?ytkowej na powierzchni ro?lin.

Okres od ostatniego zastosowania ?rodka do dnia zbioru ro?liny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania ?rodka na ro?liny przeznaczone na pasz? do dnia w którym zwierz?ta mog? by? karmione tymi ro?linami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania ?rodka na ro?liny do dnia w którym mo?na sia? lub sadzi? ro?liny uprawiane nast?pczo: nie dotyczy.

Sk?ad produktu:

Zawarto?? substancji czynnych: tritikonazol (zwi?zek z grupy triazoli) - 0,15 g/l, acetamiprid (zwi?zek z grupy neonikotynoidów) - 0,05 g/l.



UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).



Galeria

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zarzuty dotyczące rodzaj zagrożeń oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), sprzedawca musi być świadkiem sprzedaży posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającym kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

